Studienablauf CLL6
(Rezidivtherapie der fortgeschrittenen CLL)

- **Einschlußkriterien erfüllt**
- **Ausschlußkriterien nicht erfüllt**

Patienten mit schwerer Infektion innerhalbeines Jahres, die eine antibiotische Therapie <u>und</u> einen stationären Aufenthalt erforderte.

Randomisation

Fludarabin / Cyclophosphamid/ Mitoxantron (FCM)

Fludarabin:	25 mg/m²/d, 1h iv; d1-3
Cyclophosph.:	200 mg/m²/d, 1h iv; d1-3
Mitoxantron:	8 mg/m² 15-30 min iv; d1
Wiederholung:	am Tag 28
Therapiedauer:	max. 6 Zyklen

Fludarabin / Cyclophosphamid/ Mitoxantron (FCM) + G-CSF

Fludarabin:	25 mg/m²/d, 1h iv; d1-3
Cyclophosph.:	200 mg/m²/d, 1h iv; d1-3
Mitoxantron:	8 mg/m² 15-30 min iv; d1
G-CSF:	5 µg/kg/d ab Tag + 6; bis Neutrophile > 1500/µl
Wiederholung:	am Tag 28
Therapiedauer:	max. 6 Zyklen

Zyklus 1-3

Restaging

PD + NC

CR PR

Zyklus 4-6

Therapieende

Restaging

Zyklus 1-3

PD + NC

Restaging

CR PR

Zyklus 4-6

Therapieende

Restaging

Verlaufsbeobachtung alle 3 Monate